

# Post Evacuation & Curettage Treatment

كثير من الحالات بتيجي عندها missed or incomplete Abortion .... بتروح للدكتور يكحتها وتروح وتأخذ اي مضاد حيوي ومسكن وخلص!

ايه العلاج الي المفروض العيانة دي تمشي عليه بعد الكحت

## 1) Broad spectrum oral antibiotic

مضاد حيوي ضد G +ve / G -ve most common وياريت يبقى Anti-Staph فيه كثير في السوق لكن recommended هو

Rx Co-Amoxiclav (*Augmentin*) 1gm tablets 1x2x5

أو

Rx Levofloxacin (*Tavanic*) 500mg tablets 1x1x5

## 2) Anti-Anaerobes

ليه.... لأن post-Abortion Sepsis او most common causes of septic abortion هو anaerobes وبالتالي لازم ادي علاج ليه.... عندنا في مصر ٣ أدوية بيشتغلوا على anaerobes

Rx Clindamycin (*Dalacin-C*) 300mg tablets 1x3x5 ✓✓

Rx Doxycycline (*Vibramycin*) 100mg tablets 1x2x5

Rx Metronidazole (*Flagyl*) 500mg tablets 1x2x10

طب سؤال هيجيرك.... انا معنديش septic abortion .... طب ليه هدي anti- anaerobes

الموضوع prophylactic علشان ما يحصلش عندي post-abortion infection والعيانة تخش في sepsis او intra-uterine synechiae....الي هو Asherman's syndrome

### 3) Uterotonic

حاجة زي Misoprostol او Methylergometrine .... ليه؟  
علشان اقلل Post-Abortion bleeding وكمان علشان لو لسة فيه retained parts  
صغيرة مش اقدر اكلتها تخرج مع uterine contraction ... دي بنديها لمدة من يومان الى  
٣ أيام

☼ لاحظ حاجة مهمة: Methylergometrine الي هو Methergine ده ممنوع في مرضى  
الضغط المرتفع HTN والمرضى الي عندهم History of Pre-eclampsia قبل كدة  
☼ لاحظ برده ان Misoprostol ممنوع في عيانيين زي Chronic chest Asthma  
**Rx Misoprostol (Cytotec) 200µcg tablets oral 1x3x2**  
Rx Methylergometrine (Methergine) 125µcg tablets 1x3x2

### 4) Analgesics

الطبيعي يبقى فيه وجع بسيط بعد الكحت نتيجة uterine contraction و maneuvers الي احنا  
عملناها، بنكتب للعيانة علي Analgesics زي

Rx Ibuprofen (*Brufen*) 400mg tablets 1x3 PRN  
Rx Diclofenac K (*Cataflam*) 50mg tablets 1x2 PRN  
Rx Paracetamol (*Novaldol*) 1000mg tablets 1x2  
Rx Drotaverine + Paracetamol (*Petro*) 40+450mg tablets 1x3

☼ بس لاحظ ان analgesia ممكن mask fever الي بتحصل مع sepsis!

### 5) Contraception

فيه اقاويل على ده كثير، لن الأغلب بيRecommend hormonal contraception لمدة ٣ دورات  
بعد حدوث اجهاض.... ليه؟ علشان حاجتين

- ١ - يدي فرصة للرحم ان يرجع للوضع الطبيعي تماماً
- ٢ - علشان لو السقط ده كان undiagnosed partial mole ففي خلال ال ٣ شهور دول اقدر  
اعرف

فيه ناس تانية بتقول لأ، الست تحمل على طول بعد abortion ومفيش اي statistical  
difference والكلام ده Plain theories لا علاقة له بالواقع

السؤال الثاني... سواء هتدي ولا لأ... هتدي ايه؟

الأفضل combined oral contraceptive

أفضل موعد ليها بعد ١٤ يوم من حدوث السقط وقبل شهر

After 2 weeks and before 1 month

## 6) Folic Acid / Iron Supplementation

الست دي اكيد هتبقى عايزة تحمل تاني... فمن دلوقتي نبدء نصلح ليها الانيميا لو كان عندها anemia بأني ازود الأكلات الغنية بالحديد زي:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| ← اللحوم الحمراء (مثل اللحم البقري | ← السبانخ   |
| واللحم الجاموسي)                   | ← الباذنجان |
| ← الكبد (خاصة للمجترات مثل البقر)  | ← الفاصوليا |
| ← الطحال والكلى                    | ← العدس     |
| ← كبد الدجاج (النواعم)             | ← التفاح    |
| ← صفار البيض                       | ← التمر     |
| ← الاسماك                          | ← البطيخ    |
| ← العسل الأسود                     |             |

لو كانت % HB أقل من 9gm/dl دي كدة هتحتاج Iron supplementation زي

Rx *Ferrotron* (15mg Iron CHELATED on Amino-acids) 1x1

Rx *Phara Ferro 27* (27mg Iron CHELATED on Amino-acids) 1x1

Rx *Ferro-sanol Duodenal* (Ferrous (II)-glycine complex = 100 mg Fe<sup>2+</sup>) 1x1

Rx *Ferro-sanol Gyn* ((Ferrous (II)-glycine complex = 80 mg Fe<sup>2+</sup>) 1x1